









INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA II

SESIÓN 2: Formación y evolución estelar









¿Qué es una estrella?


- Una estrella es un esferoide de gas, tan caliente que se encuentra en forma de plasma, que mantiene su forma debido a su propia gravedad
- ▶ El "nacimiento" de una estrella se considera cuando esta alcanza el equilibrio hidrostático, es decir, cuando su propia gravedad está perfectamente contrarrestada por la energía que se produce en las reacciones químicas en su núcleo
- Las estrellas son los elementos básicos que constituyen las galaxias, y en la Vía Láctea solamente se estima que hay unas 100.000.000.000 de ellas
- Todas las estrellas que vemos a simple vista en el cielo pertenecen a la Vía Láctea



¿Qué es una estrella?

▶ Todas las estrellas que vemos a simple vista en el cielo pertenecen a la Vía


Láctea





Catalogando estrellas

- Para su identificación, ordenamos las estrellas en constelaciones (las más brillantes) y, tras la invención del telescopio, en catálogos
- Catálogos más importantes: Bayer, Flamsteed, Lalande, Henry Draper, Gliese, SAO, Hipparcos, Gaia





Catalogando estrellas

- La Unión Astronómica Internacional es la que regula el nombre de las estrellas y cuál es el que se debe usar entre todos los catálogos que existen
- ► COMPRAR ESTRELLAS O NOMBRAR ESTRELLAS ES UN NEGOCIO FRAUDULENTO Y NO ESTÁ RECONOCIDO POR LA UAI.




Catalogando estrellas

- La Unión Astronómica Internacional es la que regula el nombre de las estrellas y cuál es el que se debe usar entre todos los catálogos que existen
- ► COMPRAR ESTRELLAS O NOMBRAR ESTRELLAS ES UN NEGOCIO FRAUDULENTO Y NO ESTÁ RECONOCIDO POR LA UAI.



- ▶ El equilibrio hidrostático nos habla de una fuerza de presión que contrarresta la gravedad de la propia estrella
- ¿Cómo se genera esta fuerza? ¿Qué tipo de fuerza es?





- Podemos preguntarnos cuánta energía ha producido el Sol durante su vida
 - ▶ Asumimos que el Sol tiene una edad aproximadamente como la Tierra
 -> aprox. 5 x 10^9 años
 - Asumimos que el Sol ha radiado más o menos con la misma intensidad durante todo ese tiempo
 - ▶ Luminosidad del Sol es 4 x 10^26 J/s -> en toda su vida ha emitido un total de 6 x 10^43 J
 - ▶ Si el Sol tiene una masa de 2 x 10^30 kg, entonces cada kg de materia ha emitido 3 x 10^13 J



- ▶ ¿Qué proceso energético puede producir una energía de 3 x 10^13 J/kg?
- Las reacciones químicas más violentas que conocemos no producen más de 4 x 10^8 J/kg -> lo que implicaría que si el Sol produjese energía poro reacciones químicas su vida hubiese sido solamente de 50.000 años
- ▶ Otra posibilidad es que la estrella se esté contrayendo lentamente por su gravedad, lo que produce energía. Para el Sol esto sería de 2 x 10^11 J/kg insuficiente




- La fusión termonuclear puede explicarlo.
- La diferencia de masa entre 2 átomos de hidrógeno (reactivos) y 1 de helio (producto) puede explicarlo.
- $E = (4m_H m_H e)*c^2 = 4.1 \times 10^{-12} J$
- ▶ En 1kg de Hidrógeno esto se corresponde a una energía de 6 x 10^14 J
- Bingo!
- Para que esto ocurra, las temperaturas en el núcleo de la estrella deben ser de varios millones de grados. En los años 30 se estableció que la fusión nuclear es la responsable de que las estrellas brillen.



La fusión nuclear sólo permite una cierta combinación de reacciones




Protón - Protón (T < 20 millones de grados)</p>






Ciclo del carbono (T > 20 millones de grados)






Reacción triple alpha (T > 100 millones de grados)





Reacciones alpha





Combustión del carbono (T = 500 - 800 millones de grados)

$${}^{12}_{6}C + {}^{12}_{6}C \rightarrow {}^{20}_{10}Ne + {}^{4}_{2}He$$

$${}^{12}_{6}C + {}^{12}_{6}C \rightarrow {}^{23}_{11}Na + {}^{1}_{1}H$$

$${}^{12}_{6}C + {}^{12}_{6}C \rightarrow {}^{23}_{12}Mg + {}^{1}_{n}$$



Combustión del neón (T = 1.000 millones de grados)

$$^{20}_{10}Ne + \gamma \rightarrow ^{16}_{8}O + ^{4}_{2}He$$

$$^{20}_{10}Ne + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{24}_{12}Mg + \gamma$$
Alternatively
$$^{20}_{10}Ne + n \rightarrow ^{21}_{10}Ne + \gamma$$

$$^{21}_{10}Ne + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{24}_{12}Ne + n$$



Combustión del oxígeno (T = 1.500 millones de grados)

$${}^{16}_{8}O + {}^{16}_{8}O \rightarrow {}^{28}_{14}Si + {}^{4}_{2}He$$

$$\rightarrow {}^{31}_{15}P + {}^{1}_{1}H$$

$$\rightarrow {}^{31}_{16}S + n$$

$$\rightarrow {}^{30}_{14}Si + 2 {}^{1}_{1}H$$

$$\rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{2}_{1}D$$




Combustión del silicio (T > 3.000 millones de grados)

$$^{28}_{14}Si + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{32}_{16}S$$
 $^{32}_{16}S + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{36}_{18}Ar$
 $^{36}_{18}Ar + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{40}_{20}Ca$
 $^{40}_{20}Ca + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{44}_{22}Ti$
 $^{44}_{22}Ti + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{48}_{24}Cr$
 $^{48}_{24}Cr + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{52}_{26}Fe$



- A partir del hierro, los elementos más pesados no se forman por reacciones de fusión nuclear
- ¿Cómo tenemos más elementos en la tabla periódica?











Formación y evolución estelar







Nacimiento

- Las estrellas nacen por la contracción gravitatoria de gas que existe en el medio interestelar
- ▶ Hay varios mecanismos para "activar" esta contracción del gas (brazos espirales de galaxia, onda de choque de una supernova, ...)
- Hay varios mecanismos que se "oponen" a la formación de estrellas: presión interna debido a la temperatura, fuerza centrífuga, campos magnéticos, etc.
- Observamos el nacimiento de las estrellas a través de las nebulosas oscuras, los objetos de Barnard o los glóbulos de Bok



Nacimiento

Las estrellas nac medio interestel

 Hay varios meco espirales de gal

Hay varios meco presión interna magnéticos, eta

Observamos el r oscuras, los obje



s que existe en el

del gas (brazos

de estrellas: a, campos

nebulosas



Dr. Rafael Luque - Instituto de Astrofísica de Andalucía


Nacimiento

Las estrella medio inte

Hay varios espirales o

 Hay varios presión int magnética

Observam oscuras, lo





Protoestrellas

- ▶ Cuando la nube se contrae hasta alcanzar temperaturas de 10.000 °C, todo el gas se encuentra ionizado y se contrarresta la contracción gravitatoria
- Es el nacimiento de una porto-estrella
- Esta nueva fase es más lenta y suele durar decenas de millones de años
- Las protoestrellas son difíciles de observar porque viven "poco" tiempo y están envueltas en una nube de gas y polvo bastante densa
- La protoestrella sigue acertando masa hasta que el equilibrio se rompe y se produce un colapso gravitatorio. Cuando la temperatura en el centro alcanza los millones de grados, las reacciones nucleares comienzan
- ► HA NACIDO UNA ESTRELLA



Protoestrellas

Cuando la nube se el gas se encuentre


Es el nacimiento de

Esta nueva fase es

Las protoestrellas se están envueltas er

La protoestrella sig produce un colaps alcanza los millone

► HA NACIDO UNA E



de 10.000 °C, todo ción gravitatoria

illones de años

nsa tiempo y

brio se rompe y se en el centro comienzan





La secuencia principal

- Esta es la fase en la que la estrella está en equilibrio hidrostático
- La energía se produce únicamente por la combustión de hidrógeno en el núcleo
- Es la etapa más larga en la vida de una estrella
- La duración de esta etapa depende de la masa de la estrella: más masiva, más rápidamente consume el hidrógeno y también más temperatura




La secuencia principal

Esta es la fase en la

La energía se produ núcleo

Es la etapa más larg

La duración de esta masiva, más rápidal temperatura



nidrostático

n de hidrógeno en el


la estrella: más ambién más



Dr. Rafael Luque - Instituto de Astrofísica de Andalucía

La secuencia principal

- Esta es la fase en la que
- La energía se produce núcleo
- Es la etapa más larga e
- La duración de esta et masiva, más rápidame temperatura



io hidrostático

stión de hidrógeno en el

de la estrella: más y también más



Estrellas gigantes

- La fase de secuencia principal acaba cuando se agota el hidrógeno en el núcleo
- La presión interna del núcleo no puede soportar el peso de las capas externas, la estrella se comprime, la temperatura se eleva en el centro, permitiendo reacciones termonucleares más complejas
- El destino de la estrella depende de su masa



Estrellas gigantes

- La fase de secuen el núcleo
- La presión interna externas, la estrella permitiendo reaca
- El destino de la est



ta el hidrógeno en

so de las capas eva en el centro,




Fases finales: estrellas de baja masa

- Para estrellas hasta 4 veces de la masa del Sol
- ▶ Tras la secuencia principal, el núcleo se compacta hasta que se inician las reacciones triple alfa de combustión de helio. Esta reacción ocurre de manera muy rápida en toda la estrella, que provoca una expansión muy violenta (flash de helio) y la estrella crece enormemente de tamaño
- Cuando las reacciones triple alpha se paran, la temperatura no es suficientemente alta para combustiones de carbono. Poco a poco las reacciones van parando y se producen pulsaciones térmicas
- En estas pulsaciones se expulsan las capas más externas de la estrella. Cuando la radiación de la estrella ioniza el gas expulsado podemos ver los restos en forma de nebulosa planetaria
- ▶ El resto de la estrella seguirá contrayéndose hasta convertirse en una **enana blanca** que consiste solamente en electrones




Fases finales: estrellas de baja masa







Fases finales: estrellas de baja masa








Fases finales: estrellas de masa media

- Para estrellas entre 4 y 8 veces de la masa del Sol
- La combustión de helio comienza de forma progresiva, cuando se agota el helio se consume carbono
- Cuando todo el núcleo está formado por carbono degenerado se produce un mecanismo similar al flash de helio con la detonación de carbono
- Esta reacción es muy violenta y produce la explosión de la estrella
- Esta explosión conoce el nombre de supernova, que destruye la estrella progenitora



Fases finales: estrellas muy masivas


- Para estrellas con más de 8 veces de la masa del Sol
- ▶ El núcleo nunca llega a estar en estado degenerado y no hay explosiones de ningún elemento
- La nucleosíntesis se produce hasta llegar a la fusión del oxígeno, neón, magnesio y silicio. La estrella tiene una estructura similar a una cebolla






Fases finales: estrellas muy masivas

- Estas estrellas se conocen como supergigantes rojas. Si por los vientos estelares expulsan sus capas más externas se conocen como supergigantes azules.
- Al haber hierro en el núcleo, que no reacciona con nada, la situación es tremendamente inestable y la estrella explota como supernova







- Una explosión de supernova libera una energía 100 veces mayor que la energía que ha liberado el Sol durante toda su vida
- Esta explosión es más luminosa que una galaxia entera
- Durante la explosión se expulsa al medio un 96% de la masa total de la estrella progenitora y las energías son tan altas que se pueden producir todos los elementos químicos más pesados que el hierro
- Se han registrado al menos 6 explosiones de supernova en nuestra galaxia. La primera en 1054 registrada por astrónomos chinos, la famosa nebulosa del cangrejo
- Se estima que ocurre una de estas explosiones cada 50 años en nuestra galaxia



- Una explosió que ha libera
- Esta explosió
- Durante la ex progenitora y elementos qu
- Se han regist primera en 1 cangrejo
- Se estima qu








- ▶ Tras una explosión de supernova, el remanente puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro
- Las estrellas de neutrones son los objetos más densos conocidos. Contienen la masa del sol en un espacio de una ciudad como Madrid. Podemos observarlos como púlsares o erupciones de rayos X
- ▶ Los agujeros negros son una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Podemos "observarlos" a través de diferentes métodos (acretando material, ondas gravitacionales en sistemas binarios o por su efecto gravitatorio sobre otros cuerpos)











Take home diagrams










Take home diagrams







Take home diagrams

The evolving composition of the Universe

