









Programación


- Sábado, 27 de noviembre
 - ▶ S1: Exoplanetas (10:00 11:30)
 - S2: Formación y evolución estelar (12:00 13:30)
- Domingo, 28 de noviembre
 - S3: Cosmología (10:00 11:30)
- Sesiones prácticas
 - Dbservación nocturna: Sábado (18:00 22:00) y domingo (18:00 22:00)
 - Doservación solar: Domingo (12:00 13:30)


Preparativos

- Observaciones nocturnas
 - ROPA DE ABRIGO (pero mucho abrigo, nunca sobran capas)
 - Luz blanca Y ROJA (hay apps para el teléfono o con papel celofán rojo en linterna normal)
 - Comida/bebida (aunque en el alojamiento se podrán comprar bocadillos y bebida)
 - ▶ Bonus: Termo con bebida caliente, silla plegable
 - MÁS ROPA DE ABRIGO Y CALZADO APROPIADO

Preparativos

- Observaciones nocturnas
 - Cortijo La Presa: Carretera Rute
 Las Lagunillas Km . 4, 6, 14817
 Las Lagunillas, Córdoba





INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA II

SESIÓN 1: Exoplanetas









- Los exoplanetas han sido históricamente un tema de discusión y especulación
- ▶ Giordano Bruno, filósofo italiano del s. XVI, opinaba que las estrellas fijas son similares al Sol y estarían acompañadas por sus propios planetas
- Isaac Newton también hablaba de esta posibilidad en su revolucionario Principia Mathematica
- Algunas alegaciones de detecciones se han hecho desde el s.XIX debido a anomalías observadas en algunas estrellas como 70 Ophiuchi o la estrella de Barnard



▶ El primer descubrimiento de un planeta orbitando una estrella "normal", parecida al Sol, fue el de 51 Pegasi b, por el grupo suizo formado por Michel Mayor y Didier Queloz en 1995




El primparecMiche







El primer descubr parecida al Sol, fi Michel Mayor y D




estrella "normal", formado por



▶ El primer c The Nobel Prize in Physics 2019 parecida

"normal", do por


Michel Mayor y Didier Queloz er



III. Niklas Elmehed. © Nobel

James Peebles

Prize share: 1/2



III. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Michel Mayor

Prize share: 1/4



III. Niklas Elmehed. © Nobel Media.

Didier Queloz

Prize share: 1/4






- ▶ El primer descubrimiento de un planeta orbitando una estrella "normal", parecida al Sol, fue el de 51 Pegasi b, por el grupo suizo formado por Michel Mayor y Didier Queloz en 1995
- Desde 1995 hasta el día de hoy se han descubierto alrededor de ???? planetas fuera de nuestro Sistema Solar



- ▶ El primer descubrimiento de un planeta orbitando una estrella "normal", parecida al Sol, fue el de 51 Pegasi b, por el grupo suizo formado por Michel Mayor y Didier Queloz en 1995
- ▶ Desde 1995 hasta el día de hoy se han descubierto alrededor de 4500 planetas fuera de nuestro Sistema Solar










- Velocidades radiales
- Tránsitos
- Astrometría
- Microlentes gravitacionales
- Imagen directa
- Y algunos más...



- Velocidades radiales
- Tránsitos
- Astrometría
- Microlentes gravitacionales
- Imagen directa
- Y algunos más...




- Velocidades radiales
- Tránsitos
- Astrometría
- Microlentes gravitacionales
- Imagen directa
- Y algunos más...





- Velocidades radiales
- Tránsitos
- Astrometría
- Microlentes gravitacionales
- Imagen directa
- Y algunos más...






Velocidades radiales

















Masa como **Júpiter**, periodo orbital de **1 día**, señal de **200 m/s** Masa como **Júpiter**, periodo orbital de **1 año**, señal de **28 m/s**

Masa como la **Tierra**, periodo orbital de **1 día**, señal de **0.6 m/s** Masa como la **Tierra**, periodo orbital de **1 año**, señal de **0.08 m/s**

redder.


 $K \approx \left(\frac{2\pi G}{PM_*^2}\right)^{\frac{1}{3}} \frac{M_{\text{planet sin } i}}{\sqrt{1 - e^2}}$






4.2 DAYS

¿Qué arma elegir? Espectrógrafos de alta resolución






è Qué arma elegir? Espectrógrafos de alta resolución







BLUE CAMERA



Dr. Rafael Luque - Instituto de Astrofísica de Andalucía

RED CAMERA








Tránsito








Tránsito





¿Qué arma elegir? Simplemente, una cámara













- Método del tránsito
 - Perfecto para encontrar planetas con periodos cortos
 - Perfecto para medir el tamaño de los planetas con mucha precisión
 - Perfecto para observar muchas estrellas al mismo tiempo
 - Sólo detecta planetas alineados con la estrella desde nuestro punto de vista
 - No puede medir la masa de los planetas
 - A veces no puede distinguir si el objeto que bloque la luz de la estrella es un planeta o una estrella pequeña






The GOAT: la misión Kepler








The GOAT: la misión Kepler











EXCELENCIA SEVERO OCHOA
























Diversidad





Dr. Rafael Luque - Instituto de Astrofísica de Andalucía

Planetas vagabundos

- Este planeta no orbita ninguna estrella y son denominados "rogue" o "freefloating"
- Pueden ser estrellas fallidas o planetas eyectados durante la formación del sistema planetario
- Se estima que en nuestra galaxia podría haber más planetas de este tipo que estrellas







Muertos vivientes


- Estos planetas órbitas un púlsar, es decir, una estrella de neutrones que gira a velocidades de vértigo
- El cadáver de Lich es el núcleo colapsado de una estrella que explotó hace millones de años
- La radiación que emite el púlsar ha consumido los planetas del sistema totalmente y provoca enormes auroras en sus atmósferas





Tatooines

- ▶ Kepler-16 (AB) b orbita un sistema estelar binario
- Descubierto en 2011 es el primer planeta de tipo "Tatooine"
- Es un planeta similar a Saturno con una temperatura en su superficie similar a la del hielo seco





Estrellas enrabietadas

- AU Mic b es un planeta similar a Neptuno orbitando una de las enanas rojas más jóvenes que se conocen
- La juventud de la estrella hace que el planeta sufra constantemente radiación ultra energética y llamaradas estelares
- La actividad estelar hace tremendamente difícil la detección de planetas con los métodos más habituales





Mundos de lava

- ▶ 55 Cancri e pertenece a un sistema con 5 planetas y es el más cercano a su estrella
- Tiene un tamaño ligeramente mayor que la Tierra y en él un año dura 17 horas
- La temperatura es tan alta que su superficie está completamente derretida
- Hay muchos estudios acerca de si el planeta ha podido retener una atmósfera o no





Planetas habitables


- ► TRAPPIST-1 e es un planeta de tipo terrestre que orbita en la zona de habitabilidad de su estrella
- ▶ El sistema TRAPPIST-1 tiene 7 planetas de tipo terrestre y orbita una enana roja a sólo 40 años luz de nuestro sistema solar
- Durante la próxima década podremos estudiar las atmósferas de estos planetas e intentar detectar agua en ellas






Planetas habitables

- TRAPPIST-1 e terrestre que habitabilidad
- El sistema TRA tipo terrestre sólo 40 años
- Durante la pi estudiar las a e intentar de










Detectar planetas análogos a la Tierra alrededor de estrellas análogas al Sol

Estudiar las atmósferas de los planetas de tipo tierra y supertierra orbitando enanas rojas







Detectar sistemas planetarios completos análogos al sistema solar

Estudiar las atmósferas de todos los planetas en esos sistemas

Confirmar si hay vida en otros planetas











Habitabilidad







Habitabilidad







Habitabilidad

